



تاریخ
۷
دی
۱۴۰۰
سه‌شنبه

## بیماری های گوش



**تشخیص بیماری‌های گوش:**

در اکثر موارد پزشک با گرفتن شرح حال، معاینه فیزیکی و اخذ آزمایش شنوایی و یا در مواردی آزمایشات خون و یا تصویربرداری به تشخیص می‌رسد.
علایمی همچون کم شنوایی، ترشح، درد، وز وز، سرگیجه و مدت زمان و یا تکرار آن، باید بیان گردد. وجود هرگونه بیماری چون دیابت، فشارخون، بیماری‌های غددی مثل تیروئید و ضربه به گوش و یا مصرف داروها و سوابق فامیلی باید با پزشک در میان گذاشته شود. سپس پزشکشان با معاینه دقیق و با استفاده از وسایل مخصوص به بیماری شما پی ببرد.
در بسیاری از مواقع گرفتن تست شنوایی لازم است که نشان دهنده نوع و میزان کم شنوایی است. استفاده از سی‌تی‌اسکن و MRI نیز در پاره‌ای از اوقات ضروری است.
کودکان و نوزادان نیاز به تست‌های اختصاصی و پیشرفته تشخیص دارند.

**پیشگیری:**

همچون بسیاری از بیماری‌های دیگر، در اینجا نیز پیشگیری نقش بسیار پر رنگ و قابل توجهی دارد. در مواردی مثل وراثت، تنها با آگاهی دادن و مشاوره قبل از ازدواج می‌توان از افزایش نسل بیماران با ناشنوایی عمیق جلوگیری کرد.
در عفونت‌های حاد گوش میانی مراجعه به موقع به پزشک و درمان مناسب مانع از بروز عوارض همچون پارگی پرده گوش، از بین رفتن استخوانچه‌ها و تبدیل آن به عفونت مزمن که درمان مشکل‌تری دارد، می‌شود.
عدم قرارگرفتن در محیط‌های پر سر و صدا و استفاده از محافظ‌های گوش می‌تواند از بروز عوارضی که بعضاً علاج ناپذیرند، جلوگیری کند.

**درمان:**

درمان بیماری‌های گوش و کم شنوایی شامل سه دسته درمان‌های طبی، توانبخشی و جراحی می‌باشد.

مهمترین گروه از نظر تشخیص و درمان به موقع، نوزادان هستند. چنانچه کم شنوایی همان ماه‌های اول پس از تولد درکودک تشخیص داده و درمان نشود، باعث کری، عدم تکلم و اشکالات متعدد روحی، روانی و آموزشی می‌گردد.
در بیماری‌هایی مثل عفونت‌های حاد درمان فقط طبی است. استفاده از آنتی بیوتیک مناسب باعث بهبودی کامل بیمار می‌شود.
در بیماری‌ای مثل (آتیت سروز) چنانچه درمان‌های طبی جواب ندهد، درمان بعدی، جراحی خواهد بود.
در این جراحی پرده گوش باز شده و مایع غلیظ رنگ پشت آن تخلیه و سپس لوله کوچکی شبیه قرقره جهت تهویه روی پرده گوش نصب می‌گردد.

درمان پارگی پرده گوش، از بین رفتن یا چسبندگی استخوانچه و عفونت‌های مزمن تنها از طریق جراحی امکان‌پذیر است. خوشبختانه با استفاده از روش‌های علمی جدید در جراحی و کاربرد تجهیزات و وسایل پیشرفته، شانس موفقیت دراین گونه اعمال به حدود ۹۰٪ رسیده است.

**کاشت حلزون:**

درکودکان زیر ۴ سال که تکلم را یاد گرفته و دچار ناشنوایی بسیار شدید و یا کامل ذوت طرفه باشند و یا افراد بزرگسالی که پس از یادگیری تکلم به هر دلیلی کر شده باشند، از عمل جراحی کاشت حلزون استفاده می‌شود.
دراین جراحی یک حلزون مصنوعی طی عمل جراحی دقیقی در داخل گوش کار گذاشته می‌شود.
در نتیجه، فرد قادر به شنیدن می‌گردد.

البته این افراد نیاز به جلسات مکرر توانبخشی و گفتار درمانی برای شنیدن و تکلم دارند.

**سمعک گوش :**

سمعک دستگاه کوچک و ظریفی است که صوت را پس از تقویت به داخل گوش هدایت می‌کند. سمعک‌ها انواع مختلفی دارند که بسته به نوع بیماری و میزان کم شنوایی به جیبی، پشت گوش و درون گوش تقسیم می‌شوند. نوع داخل گوش کاملاً پنهان بوده و مشکل ظاهری و زیبایی را حل می‌کند. سمعک‌های نسل جدید بر خلاف اسلافشان یک رایانه کوچک قابل تنظیم و برنامه‌ریزی می‌باشند و بسیاری از معایب قدیمی‌ها مثل سوت زدن را ندارند و تحمل و استفاه از آنها بسیار بهتر شده است.

## هر شماره؛معرفی یک بیماری و پیشگیری

## و درمان آن

# این شماره: بیماری‌های گوش

صفحه
۶
شماره
۳۲۵۸
سال
بیست و هفتم



بسیار حساس و آسیب پذیر است و به راحتی صدمه می بیند؛ پس هیچ وسیله ای را نباید داخل گوش فرو کرد.

نکته مهم این است که که کانال گوش هیچ گاه نباید تمیز شود. اما اگر ترشح جرم گوش به حدی زیاد شود که منجر به بروز علائم و عوارضی شود، نیاز به تمیز کردن گوش می باشد. اما شست و شوی گوش باید تحت نظر پزشک انجام شود.یکی ار موثر ترین راه حل های رفع جرم گوش، به صورت دستی است که توسط متخصص گوش و حلق و بینی انجام می شود. در این روش، پزشک با دستگاهی کوچک، جرم ها را از گوش خارج می کند. راه دیگر بیرون آوردن آنها توسط دستگاه مکنده یا ساکشن است.

انسداد جرمی یکی از علل کاهش شنوایی است. و آن هم به این دلیل است که افراد سعی دارند جرم گوش خود را با پنبه و یا گوش پاک کن از بین ببرند. اما این کار، باعث می شود تا جرم ها به عمق کانال گوش بروند.

### همه چیز درباره ترمیم پارگی پرده گوش

پرده گوش بافتی بسیار نازک در قسمت آخر کانال گوش بوده و گوش میانی را از گوش خارجی جدا میکند. پرده گوش به علل مختلفی امکان دارد صدمه دیده و دچار پارگی شود . پارگی پرده گوش عوارض مختلفی مانند کم شنوایی – سرگیجه و عفونت گوش میانی را به همراه دارد .

تنها راه درمان پارگی پرده گوش جراحیست و اصطلاحاً این جراحی را تمپانوپلاستی میگویند. در جریان این جراحی، پرده گوش و در صورتی که استخوانچه های ظریف گوش میانی هم اشکالی داشته باشند، ترمیم می شوند.

**عوامل پارگی پرده گوش**

در اثر ضربه

پاک کردن گوش به روش نادرست

وارد کردن اجسام خارجی

فشار زیاد آب

ورود براده ی داغ آهن

عفونت های ویرال و باکتریال

قبل از جراحی پارگی پرده گوش

**درمان پارگی پرده گوش**

اگر پارگی بر اثر ورود اجسام خارجی صورت بگیرد اگر به خوبی از گوش مراقبت شود وضعیت گوش بهبود خواهد یافت.اما اگر در اثر فشار زیاد آب پرده گوش فرد پاره شود امکان بهبود خود به خود گوش خیلی کم است و در بیشتر مواقع احتیاج به جراحی دارد.بطور کل در مواردی که پارگی به خودی خود بهبود نیابد لازم است که به پزشک مراجعه شود و جراحی پرده گوش صورت بگیرد.

**روش‌های جراحی پرده گوش (میرنگوپلاستی)**

میرنگوپلاستی به جراحی ترمیم پارگی پرده تمپان گفته می شود.این جراحی به دو روش زیر امکان پذیر است:

اکسترنال: در این روش برش جراحی از پشت گوش صورت میگیرد. خواهد پذیرفت.

انترنال: در این روش برش جراحی از مجرای داخلی گوش صورت خواهد پذیرفت.

در جراحی پرده گوش پیوندی که برای پرده مورد نظر قرار گرفته است از فاشیای عضله تامپورال است.

**اقدامات قبل از جراحی پارگی پرده گوش**

اگر مایل به انجام عمل جراحی پرده گوش هستید لازم است قبل از جراحی پارگی پرده گوش نکات زیر را رعایت نمایید.

تا زمان عمل یا افرادی که سرماخورده اند کمتر تماس داشته باشید.

تا زمان عمل گوش میانی را خشک نگه دارید.

مشاوره جراحی پرده گوش

اگر هریک از عوامل زیر در شما موجود بود لازم است که به پزشک متخصص مراجعه نمایید و با وی در این ارتباط مشاوره ای داشته باشید.

–عفونت های شدید و مکرر گوش

–عفونت هایی که با آنتی بیوتیک بهبود نیافته است.


–کاهش شنوایی

–آسیب رسیدن به گوش میانی از طریق تغییر فشار هوا



–ناهنجاری ساختمانی از تخلیه و تهویه گوش جلوگیری می نماید.

**جراحی پارگی پرده گوش چگونه انجام می شود**

این جراحی معمولاً با بیبوشی کامل انجام می شود. در این جراحی در پشت گوش، ناحیه ای که بعد از عمل تقریباً از دید پنهان است، برشی داده شده و از بافت‌های آنجا لایه های نازکی برداشته و جهت پیوند آماده میشود. جراح تمهیدات و تکنیک های خاصی برای نگهداشتن



هیچ راهی در کاهش ترشح جرم گوش وجود ندارد، اما اگر شما از ترشح بیش از حد جرم رنج می برید، بهتر است هر ۶ ماه یک بار به پزشک مراجعه کنید تا میزان ترشح جرم گوش کنترل شود.



پرده پیوند شده اتخاذ می کند.

این جراحی با استفاده از میکروسکوپ انجام میشود، البته اخیراً امکان انجام آن بروش آندوسکوپی و با برش های بسیار کوچک وجود دارد که انتخاب روش به تجربه و ترجیح جراح بستگی دارد.

معمولاً چند ساعت پس از جراحی بیمار مرخص شده و باید به مدت یک هفته در منزل استراحت کند. در این مدت پانسمان روی گوش وجود دارد. پس از یک هفته پانسمان برداشته میشود و پس از آن شخص قادر به استحمام میباشد. تا زمان ترمیم کامل پرده گوش که ممکن است تا ۳ ماه طول بکشد باید نکات زیر کاملاً رعایت شود:

–جلوگیری از ورود آب به داخل گوش

–خودداری از فین کردن شدید

–خودداری از ورزش سنگین و برداشتن وزن زیاد

–عسسه و سرفه با دهان باز و بدون فشار به بینی و گوش

موفقیت در نتیجه این جراحی تا حد بسیار زیادی به تجربه و مهارت جراح بستگی دارد. البته طبیعت بیماری گوش و مراقبتهای بعد از عمل هم نقش انکارناپذیری در نتیجه بخش بودن این جراحی دارند.

**علائم شایع**

–درد ناگهانی در گوش

–ناشنوایی نسبی

–خونریزی یا ترشح از گوش. ترشح گوش ممکن است در عرض ۴۸–۲۴ ساعت پس از پارگی، شبیه چرک شود.

–وزوز گوش

–سرگیجه

**علل**

پاره شدن پرده گوش به دنبال وارد کردن یک شیء مثل گوش پاک کن یا گیره کاغذ برای تمیز کردن یا رفع خارش گوش وارد آمدن فشار ناگهانی به پرده گوش به سمت داخل، مثلاً در اثر سیلی، حادثه به هنگام شنا یا شیرجه، یا وقوع انفجار در نزدیکی فرد وارد آمدن فشار ناگهانی به پرده گوش به سمت خارج (مکش به سمت خارج) مثلاً در اثر بوسیدن گوش

–عفونت شدید گوش میانی

–عوامل تشدید کننده بیماری

–عفونت اخیر گوش میانی

– صدمه به سر

**پیشگیری**

– هیچ شئی را درون مجرای گوش فرو نکنید

– از صدماتی که ممکن است باعث پاره شدن پرده گوش شوند اجتناب کنید.

– در صورت بروز عفونت گوش میانی، سریعاً برای درمان مراجعه کنید.

### آگهی مزایده مال غیر منقول (اسناد ذمه)

برابر آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و به موجب پرونده اجرایی کلاسه ۱۰۱۴/۲/۱۱۱۷۴۰۰۰۱۱۱۷۴۰۰۱۹۹۹۰۰۳۶۱ و شماره بایگانی ۹۹۰۰۳۶۱ این اداره، له خانم نجمی جامع نژاد علیه ورثه سیامک هاشمی موضوع سند ازدواج شماره ۱۱۲۷۳-۱۳۸۰/۰۵/۳۰-۱۳۸۰ دفترخانه ازدواج ۱۵۵ خشت، موازی یک سهم مشاع از پنج سهم سهام شش‌دانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان مسکونی تحت پلاک ۸۸۳/۸۹ واقع در قطعه ۲ بخش ۷ فارس کازرون واقع در روستای گلستان که بنا به اظهار کارشناس رسمی دادگستری، عرصه شش‌دانگ ملک به مساحت ۱۰۳۸/۶۸ مترمربع می باشد که در یک پنجم زمین، یک باب ساختمان بنایی یک طبقه با دیوار آجری و پوشش گل و گچ نازک کاری و سقف تیرچه بلوک به مساحت تقریبی ۸۰ مترمربع ساخته شده است و ذیل ثبت ۹۷۵۰ دفتر املاک جلد ۱۳۴ صفحه ۴۷۱ به ثبت رسیده و سند مالیکت صادر گردیده است، محدود به این حدود: شمالاً به طول ۴۰/۸۷ متر دیواری است به باقیمانده پلاک ۸۸۳ شرقاً به طول ۲۶/۶۴ متر دیواری است به باقیمانده پلاک مزبور جنوباً به طول ۲۸/۵۵ متر به دیوار مدرسه در پلاک ۳/۵ غرباً به طولهای ۳/۵ متر و ۲۵/۶۰ متر و ۴/۲۲ متر هر سه قسمت دیواری است به کوچه ملکی آقای سیامک هاشمی فرزند خورشید به شماره شناسنامه ۴۴۱۱۶ صادره از کازرون و شماره ملی ۲۳۷۰۴۴۳۷۱۵ متولد ۰۴/۰۱/۱۳۵۵ که پلاک مزبور توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و در قبال قسمتی از طلب بستانکار و نیم عشر اجرایی و حق حراج از ساعت ۹الی ۱۲ روز دوشنبه مورخه ۱۰/۲۷/۱۴۰۰ در محل اجرای ثبت اسناد کازرون از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ۲/۳۳۳/۲۲۰/۰۰۰ ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار نقدا فروخته خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه گردد، مزایده روز اداری پس از تعطیل در همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد.بدهی های احتمالی و سایر هزینه های قانونی دیگر که تعلق بگیرد مشخص نیست و چنانچه از این بابت تا روز فروش بدهی داشته باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود.لازم به ذکر است شخصی که میخواهد به عنوان خریدار در مزایده شرکت نماید، میبایست قبل از برگزاری مزایده نسبت به واریز ۱۰٪ مبلغ پایه مزایده به حساب سپرده اداره ثبت اسناد اقدام نماید.(این آگهی در یک نوبت در روزنامه طلوع چاپ کازرون منتشر و در معابر عمومی نیز اعلام می گردد)

تاریخ انتشار:۱۰۷/۱۴۰۰/۱۴

۳۷۹۶۱۹/۱۹۵۶۱۹

۳۶۱ م الف

**داود انصاری – رئیس ثبت اسناد و املاک کازرون**